

## 참고1 인플루엔자 백신 관련 FAQ

### Q1. 예방접종 이상반응이 생겼을 때는 어떻게 신고하나요?

- (직접 신고) 예방접종도우미 누리집 혹은 이동통신 앱 → 안전한 예방접종 → 이상반응 신고하기
- (병의원 신고방법) 질병보건통합관리시스템 → 예방접종 관리 → 예방접종 안전관리 → 이상반응 → 병원/보건소 신고관리

### Q2. 독감백신 제조사마다 효과가 다른가요?

- 인플루엔자 백신은 제조사와 상관없이 인플루엔자 예방이라는 효능·효과는 동일하며, 동일한 기준에 따라 허가 받은 백신입니다.

### Q3. 유료·무료백신 효과의 차이점이 있나요?

- 유료 접종 백신과 무료 접종 백신의 효과는 차이가 없으며, 제조사가 다르더라도 접종 효과에는 차이가 없습니다.

### Q4. 어린이 1차, 2차 접종 백신의 제조사가 달라도 되나요?

- 최소 4주 간격을 유지하면 백신의 교차접종이 가능합니다.

### Q5. 우리 지역 어린이 예방접종 접종기관은 어디인가요?

- 지정 의료기관은 「예방접종도우미 누리집(<https://nip.cdc.go.kr>)」 또는 예방접종도우미 이동통신 응용프로그램(앱)을 통해 확인 가능하며,
- 지역내 접종 가능한 의료기관은 보건소에 문의하시면 확인할 수 있습니다.

**Q6. 현재 접종하고 있는 백신 중에 상온노출, 백색입자 백신이 있을 확률이 있나요? 문제 백신으로 접종하면 부작용이 있나요?**

- 현재 접종하는 모든 백신은 안전성에 문제가 없음이 확인되었고, 품질에 우려가 있는 일부 백신과, 백색입자 백신은 모두 수거·회수 대상으로 접종에 사용되지 않습니다.

**Q7. 병원마다 백신이 없다고 하는데요. 백신이 정말 부족한건가요?**

- 작년에 비해 백신 유통량은 507만도즈가 증가한 상황이나, 의료기관 개별 백신 구매량의 차이, 사업 초기에 접종자 쏠림 가능성 등을 고려 시 일부 의료기관에서 백신이 부족할 수 있습니다.

**Q8. 제가 다니는 병원에는 더 이상 백신이 공급되지 않는다고 하는데요. 백신을 보유하고 있는 병원을 어떻게 찾을 수 있나요?**

- 관할 보건소에 문의하시면 접종기관의 백신 공급량을 확인하고 방문할 수 있습니다.

**Q9. 독감과 감기, 어떻게 다른가요?**

- 감기는 다양한 바이러스가 원인이며 계절과 상관없이 걸릴 수 있습니다. 독감은 주로 겨울·봄철에 유행하는 “인플루엔자 바이러스”로 인체 감염을 일으킵니다.

**Q10. 인플루엔자 백신을 접종하면 감기도 예방할 수 있나요?**

- 그렇지 않습니다.

인플루엔자 예방접종은 인플루엔자 바이러스에 대한 백신이므로 다른 종류의 바이러스에 의한 감기에는 효과가 없습니다.

**Q11. 임신부의 경우, 백신 접종을 해도 되나요?**

- 임신 혹은 예정인 여성은 합병증이 발생할 위험이 증가되기 때문에  
필히 예방 접종을 권고하고 있습니다.

**Q12. 인플루엔자 예방접종은 한 번만 맞으면 되나요?**

- 매년 유행하는 인플루엔자 바이러스 균주가 바뀌므로 우선 접종 권장  
대상자에 속한 사람은 매년 접종하도록 권장하고 있습니다.

**Q13. 예방접종은 언제 맞아야 할까요?**

- 우리나라 인플루엔자 유행이 통상 12월부터 이듬해 5월까지 발생하고  
있고, 백신예방접종 효과 지속기간을 고려해 10월~12월 사이 예방접  
종을 권장하고 있습니다.

**Q14. 올해 인플루엔자 예방접종을 했는데 인플루엔자에 걸릴 수 있나요?**

- 네 걸릴 수 있습니다.

예방접종 후 약 2주가량 경과되면 방어 항체가 형성되며, 4주경 최고  
조에 이른 후 5개월이 지나면 소멸됩니다. 따라서 그 이전에는 인플루  
엔자에 감염될 수 있습니다.